



VERNO™ 30Cu + 30Zn FG HNOJIVO ES



Typ hnojiva dle Přílohy č. 1, Nařízení (ES) EP a Rady č. 2003/2003:

E.2.3. Hnojiva pro listové hnojení obsahující hlavní nebo druhotné živiny se stopovými živinami

Procentický obsah živin:

Měď jako oxid měďný (Cu ₂ O)	34,5%	[30% Cu]
Zinek jako oxid zinečnatý (ZnO)	37,3%	[30% Zn]

Balení: 10 kg pytle

Výrobce: Leading Farmers CZ, a.s., Klánovická 485/43, 198 00 Praha 14

VERNO je kombinované **směsné hnojivo** na bázi mědi a zinku pro listovou výživu rostlin, aplikované pro korekci nedostatku mědi a zinku. Obsahuje 30% mědi (Cu), 30% zinku (Zn), dále obsahuje malé množství vápníku (Ca), hořčíku (Mg), síry (S) a adjuvancia vyskytující se v přírodě.

VERNO obsahuje mikronizované částice oxidu měďného (Cu₂O) a oxidu zinečnatého (ZnO), silně se váže na listy a povrchové části rostlin, poskytuje zásobu pomalu se uvolňující mědi a zinku a poskytuje živiny tehdy, když je rostlina potřebuje.

VERNO je hladce sypký a téměř bezprašný dispergovatelný granulát.

FORMULACE:

Granule dispergovatelné ve vodě ke korekci nedostatku živin a ke stimulaci růstu rostlin.

DOPORUČENÉ DÁVKOVÁNÍ:

Obiloviny	200 – 500 g/ha v době odnožování do začátku sloupkování (fáze 21-25 BBCH) při výrazném nedostatku živin. Aplikace se může opakovat před metáním (fáze 45-50 BBCH).
Řepka olejná	500 g/ha ve stádiu 4. listu řepky
Luštěniny	200 – 500 g/ha při výšce rostlin 10 – 15 cm
Kukuřice, dýně	500 g/ha jako pásový postřik při setí. Použít 100 l vody na ha.
Ovocné stromy	0,5 – 1 kg/ha po sklizni, nejpozději však 14 dnů před opadáním listů.
Ořechy	200 – 400 g/ha po sklizni, během vzniku poupat na další sezónu

POKYNY PRO APLIKACI:

VERNO je vysoce koncentrovaný granulát dispergovatelný ve vodě splňující požadavky na snadné použití a na nižší energetickou náročnost při přepravě a manipulaci.

Naplňte nádrž do $\frac{3}{4}$ vodou a aplikujte příslušnou dávku, poté rozmíchejte. Verno je třeba rozpustit ve vodě PŘED přidáním adjuvantu nebo dalších příměsí! V případě tank mixů respektujte etiketu ostatních přípravků!

DÁVKA VODY:

Polní plodiny: 200 – 400 litrů vody na hektar, v závislosti na vybavení pro postřik.
Jiné plodiny: použít stejné množství vody jak je obvyklé k dosažení požadovaného pokrytí.

VERNO poskytuje lepší pokrytí. Přilne lépe než větší částice. Má vynikající přilnavost a retenci.

Používat jen v případě skutečné potřeby. Nepřekračovat doporučené dávky.



OCHRANNÁ OPATŘENÍ:

Uchovávat mimo dosah dětí (S2). Skladovat na místech k tomu určených, odolných mrazu, v uzavřených obalech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv (S13). Při manipulaci a postřiku používat gumové rukavice. Zlikvidovat prázdné pytle v souladu s předpisy stanovenými místními orgány. Při postřiku zabránit kontaminaci vodních zdrojů, a pokud po pokrytí požadovaného území není nádrž prázdná, aplikovat desetinasobně zředěný postřik.

Kontaktní údaje výrobce: Leading Farmers CZ, a.s. Klánovická 485/43 198 00 Praha 14 Tel.: 281 860 862 Mobil: 724 717 781 www.Leadingfarmers.cz	Původ hnojiva: Nordox AS Østensjøveien 13 0661 Oslo/Norsko Tel.: +47 22 97 50 00 www.nordox.no
--	---

Toxikologické informační středisko (TIS): 224 919 293, 224 915 402